

Додаток 1
до Уніфікованого клінічного
протоколу первинної та вторинної
(спеціалізованої) медичної
допомоги «Бронхіальна астма у
дітей»
(пункт 3.2 розділу III)

Класифікація бронхіальної астми

За етіологією (при можливості уточнення на рівні спеціалізованого центру):

Алергічна (екзогенна, J45.0), яка виникає під впливом неінфекційних інгаляційних алергенів:

атопічна (IgE – залежна);

неатопічна (не IgE – залежна);

Неалергічна (ендогенна, J45.1), до якої відносять неімунні форми БА (астма фізичного навантаження, аспіринова БА).

Змішана (J45.8), при якій розвиток і подальший перебіг захворювання відбувається, як під дією інфекційних, так і неінфекційних факторів.

Ступінь важкості БА оцінюється ретроспективно за рівнем терапії (протягом декількох місяців), яка потрібна для контролю симптомів і загострень. Ступінь тяжкості не є постійною характеристикою хворого і змінюється з часом (під впливом терапії та різних чинників).

За ступенем важкості виділяють:

Легкий перебіг - захворювання добре контролюється на 1 та 2 кроці базисного лікування;

Середньо-тяжкий - захворювання добре контролюється на 3 кроці базисного лікування;

Важкий - захворювання добре контролюється на 4 або 5 кроці базисного лікування.

За рівнем контролю БА класифікують як контрольовану, частково контрольовану, неконтрольовану.
